

令和6年度 予防接種年間予定表

個別接種【協力医療機関にて実施】

☆予防接種は、決められた対象年齢、回数、間隔等を守って受けましょう。
 対象年齢を超えると無料で受けることはできません。接種間隔については医療機関とご相談ください。
 ☆年齢についてご注意
 誕生日の1日前に歳をとります。これにより接種期限は次のようになります。
 例*「1歳に至るまで」、「1歳未満」は、1歳の誕生日の前々日まで接種ができます。

<お問合せ先>
 喬木村役場保健福祉課健康保険係
 (直通)33-5125

〈令和6年2月末時点〉

予防接種名	対象年齢		望ましい期間	回数	間隔	備考
ロタウイルス	【ロタリックス(1価)】 生後6週0日～24週0日まで 【ロタテック(5価)】 生後6週0日～32週0日まで		初回接種は生後14週6日まで。 安全性の観点から、生後15週0日以降 の初回接種はお勧めしません。	(1価) 2回 (5価) 3回	27日以上	ワクチンの種類によって接種回数が異なりますが、ワクチンの効果に違いはありません。最初に受けたワクチンと同じ種類を接種してください。
ヒブ(Hib感染症)	生後2ヶ月以上、5歳に至るまで		初回:生後2～7ヶ月未満に開始 生後12ヶ月までに 追加:初回終了後7～13ヶ月の間	3回 1回	27日以上	生後7～12ヶ月未満に接種を開始した場合:初回2回、追加1回 生後12～60ヶ月に接種を開始した場合:1回接種
小児用肺炎球菌	生後2ヶ月以上、5歳に至るまで		初回:生後2～7ヶ月未満に開始 生後12ヶ月までに 追加:初回終了後60日以上 生後12～15ヶ月の間	3回 1回	27日以上	生後7～12ヶ月未満に接種を開始した場合:初回2回、追加1回 生後12～24ヶ月未満に接種を開始した場合:60日以上の間隔で2回接種 生後24～60ヶ月に接種を開始した場合:1回接種
四種混合 (ジフテリア・百日せき・ 破傷風・不活化ポリオ)	1期	生後2ヶ月～ 7歳6ヶ月に至るまで	初回:生後2～12ヶ月未満 追加:1期初回終了後1～1年半後	3回 1回	20日～56日まで	
B型肝炎	1歳に至るまで		生後2ヶ月～9か月至るまで	3回	2回目は27日以上 3回目は139日以上 (どちらも1回目から)	
BCG(結核)	1歳に至るまで		生後5～8ヶ月の間	1回		
MR (麻しん・風しん)	1期	1歳～2歳に至るまで		1回		
	2期	小学校就学前の1年間 (H30.4.2～H31.4.1月生)		1回		4月に予診票を郵送します。(令和7年3月末まで接種可)
水痘	1歳～3歳に至るまで		初回:生後12～15ヶ月の間 追加:初回終了後6～12ヶ月後	1回 1回	3か月以上	
	1期	生後6ヶ月～ 7歳6ヶ月に至るまで	初回:3歳 追加:4歳	2回 1回	6日～28日まで 初回終了後6ヶ月～ 概ね1年後	3歳になる月に予診票を郵送します。 4歳になる月に予診票を郵送します。
日本脳炎	2期	9歳以上13歳未満	9歳	1回		9歳になる月に予診票を郵送します。
	H14.4.2～H19.4.1生で接種機会を 逃したたお子さまの対応		2期:18歳	1回		H18.4.2～H19.4.1生まれで2期が未接種の方には4月に予診票を郵送します。
二種混合 (ジフテリア・破傷風)	2期:11歳以上13歳未満		11歳	1回		11歳になる月に予診票を郵送します。
子宮頸がん予防ワクチン (HPV感染症)	小学6年生～高校1年生相当の女子		小学6年生～	2回 (3回)	9価(シルガード9) →	(1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合)初回、初回から6ヶ月後 (1回目の接種を15歳になってから受ける場合)初回、初回から2か月後、初回から6か月後
	H9.4.2～H19.4.1生の女性で 接種機会を逃したみなさまの対応			3回	2価(サーバリックス) →	初回、初回から1ヶ月後、初回から6ヶ月後
					4価(ガーダシル) →	初回、初回から2ヶ月後、初回から6ヶ月後